



* Högriskland för tbc är Afrika söder om Sahara, södra och sydöstra Asien utom Kina samt Bolivia och Peru

** Land med ökad risk för tbc är de flesta länder utanför Nordamerika, Västeuropa, Australien och Nya Zeeland

*** Information om tidiga symptom finns på www.regionvasterbotten.se/smittskydd - Tuberkulos i Information om tuberkulos, PPD och BCG (bilaga 19)

**** QFT är Quantiferontest, tas ej på person som tidigare varit QFT pos alt. behandlats för latent eller aktiv tbc. Om kvinnan har symptom eller blivit exponerad efter tidigare pos QFT remiss till spec.mödravård för ställningstagande till lungröntgen.

***** Lungröntgen utförs lämpligen under graviditetsvecka 15-28. Lungröntgen undviks normalt de första 12 graviditetsveckorna, men vid symptom ska man inte avvakta.

Remiss med frågeställning **latent tuberkulos**, bifoga hälsodeklaration, QFT-svar, ev lungrtgsvar (kan skickas samtidigt som lungröntgenremiss) skickas till Infektionskliniken, Umeå, Medicin- och rehabklinik, Lycksele resp. Medicin-geriatriska kliniken, Skellefteå

Remiss med frågeställning **aktiv tuberkulos**, bifoga hälsodeklaration, QFT-svar, ev lungrtgsvar (kan skickas samtidigt som lungröntgenremiss) skickas till Infektionskliniken, Umeå.