

# MEDIACIN

Nr 15/18 11 okt

## MEDICINSKT MAGASIN UTGIVET AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTERBOTTEN



Utkommer varannan vecka. Sökväg: [vll.se](http://vll.se) och [linda](mailto:linda@vll.se) /Vård /Läkemedel/

REDAKTION: Läkemedelskommitténs kansli  
ANSVARIG UTGIVARE: Bo Sundqvist  
REDAKTÖR: Therese Ahlepil 072-740 39 09  
Nästa nummer utkommer torsdag 25 oktober med  
calendarieuppgifter för veckorna 44 och 45 2018

Bidrag ska vara redaktionen tillhanda senast måndag 15 okt kl 12.00 till [therese.ahlepil@vll.se](mailto:therese.ahlepil@vll.se) eller fax: 090-12 04 30 Postadress: Therese Ahlepil, Läkemedelscentrum, NUS, 901 85 Umeå

### Behandling med starka perorala opioider vid icke malign smärta Rekommendation från Läkemedelskommittén i Västerbotten

Då det finns behov av behandling med starka opioider rekommenderas och föredrages morfin p.g.a. att det har en betydligt mer omfattande vetenskaplig och klinisk dokumentation och en lägre beroendepotential än oxikodon, fentanyl, petidin och ketobemidon (Ketogan). Om smärtan beräknas bli långvarig bör långverkande beredningar användas eftersom de kortverkande formerna har större risk för tillvänjning.

I första hand används perorala medel eftersom intermittent parenteral dosering ger större variationer i plasmakoncentration. Vid nedsatt njurfunktion bör depåberedningar användas med försiktighet.

För vid behov-dosering rekommenderas **Morfin**, som finns i tablettform som 10mg och 20mg och i oral lösning med 2mg/ml och 5mg/ml. För kontinuerlig behandling rekommenderas **Dolcontin**, som finns som tabletter i styrkorna 5mg, 10mg, 30mg, 60mg och 100 mg. Morfin och Dolcontin bör undvikas vid eGFR under 30ml/min.

I intervallet eGFR 30-60ml/min bör dosen vara hälften av normaldos alternativt att dosintervallet förlängs. Vid genombrottsmärta ges Morfin i 1/6 av dygnsdosen.

I enstaka fall kan oxikodon föredras, framför allt vid låg njurfunktion, eftersom oxikodon saknar aktiv metabolit. Vid behovsmedicinering används då **Oxikodon** (finns i styrkorna 5mg, 10mg och 20mg). Vid behov av kontinuerlig behandling används **Oxikodon Depot** som doseras 2 gånger per dygn och som finns i styrkorna 5mg, 10mg, 20mg, 40mg och 80mg. Även dosen oxikodon bör reduceras vid eGFR under 60ml/min, men kan ges ned till eGFR 15ml/min under noggrann observation.

Morfin och oxikodon har likvärdig biologisk effekt och biverkningsmönster i peroral beredning, men man uppskattar att oxikodon är 1,5 gånger så potent som morfin per mg.

Fentanyl bör i princip endast användas för malign smärta pga. att den har en snabb toleransutveckling. Fentanylplåster kan vara ett alternativ vid nedsatt njurfunktion hos palliativa patienter.

Ketobemidon (Ketogan) bör man undvika pga. att det anses ha en klart större beroenderisk. För ytterligare information, v.g. se Terapirekommendationerna (i 2018 års upplaga sidan 155).

*Bertil Ekstedt, informationsläkare,  
Läkemedelskommittén*

### Nyheter från Svensk Dos: Restsituation för Furix Retard, depotkapsel 30 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation hos tillverkaren på läkemedlet Furix Retard, depotkapsel, hård 30 mg. Läkemedlet förväntas finnas tillgängligt i början av januari 2019.

Furix Retard finns i det dispenserbara sortimentet och för närvarande finns det inget direkt utbytbart alternativ på marknaden. Vi uppmanar förskrivare att snarast se över samtliga förskrivningar av Furix Retard 30 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Lasix Retard 30 mg innehåller samma verksamma ämne, i samma mängd och i samma beredningsform, som Furix Retard och finns tillgängligt i det dispenserbara sortimentet.

# CALENDARIUM

## MEDICORUM BOTNIAE OCCIDENTALIS

Calendarium tar upp t.ex. föreläsningar, kurser, disputationer och andra evenemang av medicinskt intresse i hela Västerbotten – bidrag mottages tacksamt!

När inte annat anges är platsen NUS

Anledningen till att de båda läkemedlen inte är utbytbara är enligt Läkemedelsverket avsaknad av studier som visar att de är bioekvivalenta/terapeutiskt likvärdiga.

När Furix Retard 30 mg åter finns tillgängligt på marknaden är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

*Svensk Dos, Uppsala 2018-09-27*

### Qlaira – förtydligande om subvention!

Subvention av preventivmedel för kvinnor till och med 25 års ålder gäller i Västerbotten sedan 1 januari 2014. Förskrivet preventivmedel måste hämtas ut på apotek före den dag kvinnan fyller 26 år. Kostnaden per år begränsas till 100 kr och omfattar endast de preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen.

Qlaira har begränsad subvention enligt beslut från TLV och subventioneras endast för kvinnor med rikliga menstruationsblödningar (menorragi) där andra kombinerade p-piller inte ger tillräcklig blödningsreduktion, och där spiral med levonorgestrel inte är ett alternativ. Qlaira subventioneras alltså inte för enbart antikonception. Därmed ingår inte Qlaira i landstingets subvention av preventivmedel till kvinnor under 25 år

*Läkemedelskommittén*

### Vecka 42

**Onsdag 17 oktober kl 09-12 alt. 13-16**

**Pascalutbildning, Umeå**

Målgrupp läkare

Datasal Heckla, NUS

Anmälan via utbildningsportalen senast 12 okt

**Fredag 19 oktober 08:30-11:30**

**Vidareutbildning för distriktsläkare (VUB)**

Fullmäktigesalen, Landstingshuset samt videolänk

Anmälan via utbildningsportalen senast 14 okt

**Lördag 20 oktober 09:00-12:00**

**Årshögtiden Umeå Universitet**

Många olika föreläsningar á 20 min

Samhällsvetarhuset

### Vecka 43

**Tisdag 23 oktober kl 09-12 alt. 13-16**

**Pascalutbildning, Umeå**

Målgrupp läkare

Datasal Heckla, NUS

Anmälan via utbildningsportalen senast 19 okt

**Onsdag 24 oktober 12:10-12:55**

**Läkemedelslunch: Fysisk aktivitet och psykisk hälsa**

med Jill Taube, psykiatriker, författare och föreläsare, Stockholm.

Betula, NUS samt videokonferens.

Anmälan via utbildningsportalen senast 21 okt

*Läkemedelscentrum*

**Lördag 27 oktober**

**13:00-14:30**

**Fika efter en forskare**

Föreläsare: Intissar Anan, Gustav Andersson och Johan Normark.

Vävens Kafé Fika


## Centrala receptfavoriter

Färdiga basrecept direkt i läkemedelsmodulen  
utifrån VLLs senaste terapirekommendationer  
Snabbt och patientsäkert!

Hitta recept via preparat. §xxx+tab (ex §selex)

Hitta recept via diagnos. §\*xxx+tab (ex §\*uvi)

Läs mer på linda under läkemedel  
och behandlingsanvisningar.

 VÄSTERBOTTENS  
LÄNS LANDSTING