

## Provtagning från nasopharynx för viruspåvisning


### Förberedelser

Förbered provröret enligt metodbeskrivningen och ta på personlig skyddsutrustning.

### Tillvägagångssätt

1. Tryck personens nästipp uppåt för att se bättre.
2. För in provtagningspinnen genom ena näsöppningen. Undvik att vidröra huden med spetsen.
3. Följ näsbotten horisontellt och långt in (se bild) tills du känner att pinnen når den bakre svalgväggen. OBS! Tryck inte hårt. Backa om du stöter på motstånd och försök igen i samma eller motsatt näsöppning.
4. Snurra pinnen några varv och låt den ligga kvar i 5 sekunder.
5. Dra pinnen rakt ut med en jämn rörelse. Undvik återigen att vidröra huden med spetsen.
6. Sätt ner pinnen i det förberedda provröret och fortsätt analysen enligt metodbeskrivningen.

**OBS: Felaktig provtagning kan resultera i falskt negativa svar.**



Källa originalbild: © Sémhur / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

*Fritt efter instruktion som tagits fram av Klinisk Mikrobiologi i Region Skåne*

Utgåva 1

Fastställd 2021-02-15

av Åsa Gylfe, Ansvarig läkare vid Klinisk Mikrobiologi