

Beslutsstöd för val av skyddsutrustning vid hög risk för, eller bekräftad covid-19

Skyddsutrustning	Prata med patient (avstånd >2 m)	Vårdåtgärd utan risk för kontakt med kroppsvätskor (t.ex. kontroll vitalparametrar)	Vårdåtgärd med risk för kontakt med kroppsvätskor (t.ex. ta blodprov, tömma KAD-påse, lägesändring)	Vårdåtgärd hos patient med hög smittsamhet (t.ex. svårt sjuk med kraftiga symtom)	Vårdåtgärd med risk för aerosolbildning (t.ex. HLR, CPAP, BiPAP, trakeostomivård)
Basala hygienrutiner *	JA ✓	JA ✓	JA ✓	JA ✓	JA ✓
Plastförkläde utan ärm	NEJ ✗	JA ✓	JA ✓	NEJ ✗	NEJ ✗
Plastförkläde med lång ärm	NEJ ✗	NEJ ✗	NEJ ✗	JA ✓	JA ✓
Stänkskydd: visir	NEJ ✗	JA ✓	JA ✓	JA ✓	JA ✓
Stänkskydd: munskydd	NEJ ✗	JA ✓	JA ✓	JA ✓	NEJ ✗
Andningskydd FFP2/FFP3	NEJ ✗	NEJ ✗	NEJ ✗	NEJ ✗	JA ✓
Handskar	NEJ ✗	NEJ ✗	JA ✓	JA ✓	JA ✓

*Patient som triagerats som **LÅG RISK** vårdas enligt **basala hygienrutiner**. I basala hygienrutiner ingår visir vid risk för stänk mot ansiktet. Under covid-19-pandemin, addera vätsketätt munskydd (IIR) om patienten har hosta eller nyser.

