

Produkt	Xenical	Mysimba	Saxenda	Wegovy	Mounjaro
Företag	Cheplapharm	Navamedic	Novo Nordisk Scandinavia	Novo Nordisk Scandinavia	Lilly
Aktiv substans	orlistat	naltrexon/ bupropion	liraglutid	semaglutid	tirzepatid
Form	Kapsel, peroral	Depot-tablett, peroral	Sc. Injektion, 1 dos/d	Sc. Injektion, 1 dos/v	Sc injektion, 1 dos/v
Styrka, maxdos	120 mg, max 120 mg x 3	8 mg/90 mg max 32 mg /360 mg	0,6 mg/d max 3,0 mg/d	0,25 mg/v max 2,4 mg/v	2,5 mg/v max 15 mg/v
Indikation vuxna	Som komplement till kalorireduktion. BMI ≥ 30 alt ≥ 28 med riskfaktorer	BMI ≥ 30 alt 27-30 + ≥ 1 viktrelaterad komorbiditet**	BMI ≥ 30 alt 27-30 + ≥ 1 viktrelaterad komorbiditet**	BMI ≥ 30 alt 27-30 + ≥ 1 viktrelaterad komorbiditet**	BMI ≥ 30 alt 27-30 + ≥ 1 viktrelaterad komorbiditet**
Ålder	Vuxna	Vuxna	Vuxna / Barn ≥ 12 år	Vuxna / Barn ≥ 12 år	Vuxna
Avslut av behandling efter:	12 v om ej $>5\%$ viktmedgång	16 v om ej $>5\%$ viktmedgång	12 v om ej $>5\%$ viktmedgång	16 v (12 v för barn) om ej $>5\%$ viktmedgång	Anges ej
Subventionerat vid	BMI >35 alt BMI >28 vid T2D	-	-	-	-
Kostnad per månad OBS Fri prissättning	Ca 70 kr med maximal dosering	Ca 1000 kr med maximal dosering	Ca 2500 kr med maximal dosering	Ca 3300 kr med lägsta dosering	Ca 2000 kr med lägsta dosering
Verkningsmekanism	Hämmar fettupptag i mage och tarm	μ -opioid-antagonist/NDRI, centralt verkande	GLP1RA, förlångsammad ventrikeltömning, minskad hunger	GLP1RA, förlångsammad ventrikeltömning, minskad hunger	GLP1-RA + GIP-RA, förlångsammad ventrikeltömning, minskad hunger
Mycket vanliga biverkningar ($>10\%$)	Oljig avföring, Flatulens, Buksmärta, Huvudvärk, ÖLI	Illamående, Kräkning, Förstoppning, Huvudvärk	Illamående, Kräkning, Diarré, Förstoppning, Huvudvärk	Illamående, Kräkning, Diarré, Förstoppning, Huvudvärk, Trötthet	Illamående, Kräkning, Diarré, Förstoppning, Buksmärta
Placebokorrigerad viktmedgång 1 %	3 % efter 24 v*	4 % efter 56 v*	5 % efter 56 v*	10 % efter 68 v*	20 % efter 72 v*

Samtliga läkemedel är indicerade endast som komplement till kalorireduktion och ökad fysisk aktivitet.

*Olika könsfördelning, olika utgångs-BMI samt olika livsstilsinterventioner i studiepopulationerna gör jämförelserna osäkra, men viktmedgången är ungefär i den storleksordning som anges.

**Viktrelaterad komorbiditet t ex hypertoni, dyslipidemi, OSAS, kardiovaskulär sjukdom, prediabetes eller diabetes typ 2.

Tabell inspirerad av Janus-info, tidningen Evidens (Nr 1, 2023).