

Vaccination mot influensa och pneumokocker - generellt direktiv om läkemedelsbehandling

Berörda enheter

Enhet:

(Fylls i av respektive enhet)

Syfte

Generellt direktiv om läkemedelsbehandling avseende vaccination mot influensa och pneumokocker enligt HSLF-FS 2017:37

Influensa- och pneumokockvaccination enligt generellt direktiv om läkemedels-behandling omfattar sjuksköterskor vid berörda enheter enligt ovan efter genomgången utbildning som är godkänd av verksamhetschefen.

Indikationer för influensavaccination med förstärkt vaccin Fludac

- Brukare 65 år och äldre boende på SÄBO
- Personer 65 år och äldre med hemsjukvård

Indikationer för influensavaccination

Sjuksköterskor som omfattas av de generella direktiven kan administrera influensavaccin till vuxna personer som tillhör nedan beskrivna grupper som riskerar allvarlig sjukdom i samband med influensa, förutsatt att personen saknar kontraindikation för influensavaccination.

- personer 65 år och äldre
- gravida efter graviditetsvecka 12
- vuxna personer med följande sjukdomar eller tillstånd:
 - kronisk hjärtsjukdom
 - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma
 - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
 - kronisk lever- eller njursvikt
 - diabetes mellitus

Förutom till patienter kan sjuksköterskor som omfattas av generella direktiv även administrera influensavaccin till *personal* anställda hos Region Västerbotten som saknar kontraindikation för vaccination.

Indikationer för pneumokockvaccination

Samma riskgrupper som för influensavaccination, utom gravida, omfattas av de generella direktiven för pneumokockvaccination. De allra flesta rekommenderas bara en dos pneumokockvaccin, som inte behöver upprepas. Personer med mycket nedsatt immunförsvar kan dock ordineras även annat pneumokockvaccin (Prevenar 13), detta vaccin omfattas ej av de generella direktiven.

Kontraindikation

Innan ställningstagande till administrering av influensavaccin till patient eller personal ska personen fylla i *Hälsodeklaration och dokumentation vid personalvaccination mot influensa respektive Hälsodeklaration vid influensa – och pneumokockvaccination, patient*”.

Om personen anger överkänslighet mot ägg eller annan allergi/överkänslighet kontaktas behörig förskrivare (läkare) för bedömning och ev. ordination.

Läkare kontaktas om personen tidigare haft någon allvarlig reaktion (allvarlig allergisk reaktion mot något, som t.ex. födoämne, läkemedel eller vaccin som krävt behandling).

Även patienter eller personal som har någon behandling som kan påverka immunförsvaret, t ex cytostatikabehandling bedöms av läkare.

Vid pågående infektion/feber bör vaccinationen senareläggas.

Läkemedel för behandling av anafylaxi eller annan överkänslighetsreaktion ska alltid finnas tillgänglig vid vaccination.

Dosering vuxna

Upphandlat säsongsinfluensavaccin 2022/2023:

Fluad (inj.vätska)

Vaccinet levereras i förfylld spruta utan kanyl i 10-pack.

Vaccinet ska ges till brukare 65 år och äldre på SÄBO och personer 65 år och äldre med hemsjukvård, ges en gång per influensasäsong.

Dos vuxen: 0,5 ml intramuskulärt i överarmens deltoideusmuskel.

Vaxigrip Tetra (inj.vätska)

Vaccinet levereras i förfylld spruta utan kanyl i 10-pack.

Vaccinet ska till vuxna ges en gång per influensasäsong.

Dos vuxen: 0,5 ml intramuskulärt i överarmens deltoideusmuskel.

Vid blödningsbenägenhet vaccinet ges subcutant.

Upphandlat pneumokockvaccin 2022/2023:

Pneumovax (inj.vätska)

Vaccinet levereras i förfylld spruta.

Dos vuxen: 0,5 ml intramuskulärt i överarmens deltoideusmuskel.

Vid blödningsbenägenhet kan vaccinet ges subcutant.

Dokumentation

Influensavaccination dokumenteras enligt gällande rutin för vaccinationer.

Datum

Medicinsk ansvarig läkare:

Namnförtydligande:

Det generella direktivet ska uppdateras och signeras inför varje influensasäsong.